

Feuillet d'information Ribociclib (Kisqali^{md})

Les informations contenues dans ce document sont très importantes et vous aideront pendant toute la durée de votre traitement.

Description

Le ribociclib est une thérapie ciblée appelée [inhibiteur des CDK 4/6](#) qui améliore la durée d'efficacité des traitements hormonaux.

Le ribociclib **doit être prescrit** avec une [anti-hormone \(hormonothérapie\)](#).

Mode d'emploi

Il s'agit de comprimés à prendre 1 fois par jour, avec ou sans nourriture, pendant 21 jours suivi d'une semaine de repos. On parle généralement d'un cycle de 28 jours qui inclut la pause de 7 jours. Le JOUR 1 correspond au premier jour du cycle. Notez que de débiter les cycles un jeudi facilite la prise des rendez-vous de suivi.

Cette médication peut être prise avec ou sans nourriture. Si vous avez « l'estomac fragile » ou des nausées, prenez la médication en mangeant ou en terminant le repas.

Prenez le ribociclib idéalement à la même heure chaque jour. Si vous oubliez une dose, et vous vous en rendez compte le lendemain, ne reprenez pas la dose omise et prenez votre prochaine dose comme prévu.

Ne doublez pas la dose pour compenser une dose oubliée.

Le comprimé ne doit pas être croqué ni écrasé.

Le ribociclib peut interagir avec d'autres médicaments. Il est important de mentionner tous les médicaments et produits naturels que vous prenez à votre pharmacien avant de débiter le traitement. En cours de traitement, votre pharmacien communautaire vérifiera les interactions avec le ribociclib lorsqu'un nouveau médicament sera prescrit. Vérifier toujours avec votre pharmacien communautaire avant de débiter un produit naturel.

Ne consommez pas de **pamplemousse / carambole / orange de Séville / grenade / pomelo** pendant votre traitement avec le ribociclib, ni pendant la semaine de pause. Ces fruits et leur jus pourraient augmenter les effets indésirables de votre médicament.

Assurez-vous de respecter **rigoureusement vos rendez-vous pour les prélèvements sanguins et les ECG** (électrocardiogramme) selon les recommandations que vous recevrez. Ce médicament peut entraîner certains effets secondaires qui ne peuvent être détectés qu'avec ces tests.

*Les calendriers suivants vous aideront dans la prise de vos médicaments. Selon votre situation, un membre de l'équipe du CMS ou l'application numérique Medherize vous guideront **au début** afin de respecter les suivis pour les prélèvements sanguins et l'ECG reliés à la prise de ribociclib.*

CALENDRIER POUR LA PRISE DE VOS MÉDICAMENTS

CYCLE 1

Première dose de ribociclib, _____ le ____/____/20____ à ____:____. Il s'agit du JOUR 1.

Jour Mois Année Heure

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Date																												
Ribociclib (Kisqali)																												
Anti-hormone																												
Prise de sang														✓ +ECG														✓

Au besoin, prendre Graval 50mg, 1 comprimé aux 4 à 6 heures si nausées

Rendez-vous _____ le ____/____/20____ à ____:____/____:____/____:____.

Jour Mois Année Heure

CYCLE 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Date																												
Ribociclib (Kisqali)																												
Anti-hormone																												
Prise de sang														✓														✓

Au besoin, prendre dimenhhydrinate (Graval^{md}) 50mg, 1 comprimé aux 4 à 6 heures si nausées

CALENDRIER POUR LA PRISE DE VOS MÉDICAMENTS (suite)

CYCLE 3 à 6

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Date																												
Ribociclib (Kisqali)																												
Anti-hormone																												
Prise de sang																												✓

Au besoin, prendre dimenhydrinate (Gravol^{md}) 50mg, 1 comprimé aux 4 à 6 heures si nausées

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Date																												
Ribociclib (Kisqali)																												
Anti-hormone																												
Prise de sang																												✓

Au besoin, prendre dimenhydrinate (Gravol^{md}) 50mg, 1 comprimé aux 4 à 6 heures si nausées

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Date																												
Ribociclib (Kisqali)																												
Anti-hormone																												
Prise de sang																												✓

Au besoin, prendre dimenhydrinate (Gravol^{md}) 50mg, 1 comprimé aux 4 à 6 heures si nausées

CALENDRIER POUR LA PRISE DE VOS MÉDICAMENTS (suite 2)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Date																												
Ribociclib (Kisqali)																												
Anti-hormone																												
Prise de sang																												

Au besoin, prendre dimenhydrinate (Gravol^{md}) 50mg, 1 comprimé aux 4 à 6 heures si nausées

CYCLE 7 et plus

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Date																												
Ribociclib (Kisqali)																												
Anti-hormone																												
Prise de sang						Lors des visites médicales et sur demande seulement																						

Au besoin, prendre dimenhydrinate (Gravol^{md}) 50mg, 1 comprimé aux 4 à 6 heures si nausées

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Date																												
Ribociclib (Kisqali)																												
Anti-hormone																												
Prise de sang						Lors des visites médicales et sur demande seulement																						

Au besoin, prendre dimenhydrinate (Gravol^{md}) 50mg, 1 comprimé aux 4 à 6 heures si nausées

Effets secondaires les plus fréquents

Le ribociclib peut provoquer de la [neutropénie](#) (baisse des globules blancs), des [nausées](#), de la [diarrhée](#), de la [mucosite](#) (ulcères dans la bouche), de la fièvre, des frissons, des infections, de l'arythmie cardiaque, de la thrombocytopénie (baisse des plaquettes sanguines), des saignements et [l'éclaircissement des cheveux](#) et [une fatigue inhabituelle](#).

Les prochaines parties de ce document pourront vous aider à mieux gérer les effets secondaires s'ils surviennent.

Ne suspendez et ne cessez jamais la médication sans aviser l'équipe du CMS au 418 525-4444 poste 84627 ou 87878. L'équipe pourrait vous proposer des solutions pour atténuer vos effets secondaires ou modifier vos traitements.

Informations supplémentaires

La prise du ribociclib pendant la grossesse est nocive pour le fœtus en développement. Toute grossesse doit donc être évitée. Un moyen de contraception sans hormone (condom, stérilet de cuivre, vasectomie du conjoint) doit être utilisé chez la femme en âge de procréer pendant ce traitement. Si vous avez des projets de grossesse, veuillez en parler avec votre médecin du Centre des maladies du sein lors d'une visite médicale.

La fièvre, les frissons et l'infection sont souvent expliqués par la baisse des globules blancs qui peut prédisposer aux infections. La fièvre est souvent un signe d'infection, c'est pourquoi :

- *Si votre température est de 38,3 Celsius et plus, présentez-vous à l'urgence sans tarder.*
- *Si votre température est de 38 Celsius, ne prenez ni acétaminophène (Tylenol^{md}) ni ibuprofène (Advil^{md}, Motrin^{md}) qui pourraient masquer la fièvre, et recontrôlez votre température dans une heure. Si elle est encore à 38 Celsius ou plus, présentez-vous à l'urgence.*

Les [nausées](#) peuvent se présenter, les vomissements sont rares. Pour ce,

- Prenez de plus petits repas plus fréquemment.
- Vous pouvez prendre du dimenhydrinate (Gravol^{md}), puisque cet anti-nauséeux n'interfère pas avec le ribociclib. L'utilisation de prochlorpérazine (Stémétil^{md}) n'est pas recommandée avec le ribociclib en raison des risques de trouble du rythme cardiaque.

La [diarrhée](#) peut survenir. Si, c'est le cas :

- Maintenez une bonne hydratation
- Prenez du lopéramide (Imodium^{md}), 2 comprimés immédiatement puis 1 comprimé après chaque selle jusqu'à un maximum de 8 comprimés par jour.

Si vous avez de la fièvre, une douleur abdominale importante ou du sang dans vos selles, ne prenez pas de lopéramide (Imodium^{md}) et présentez-vous à l'urgence.

Si votre diarrhée ne s'améliore pas après 24-48 heures de prise du lopéramide (Imodium^{md}), contactez votre équipe soignante, ou si vous ne pouvez les joindre, présentez-vous à l'urgence.

Prévention

Des [mucosites](#) sous forme d'**ulcères** ou de **douleur dans la bouche** peuvent survenir. Les conseils suivants peuvent les prévenir et soulager :

- Utilisez un gargarisme maison 4 fois par jour :

***RECETTE :** 1 cuill. à thé de sel de table + 1 cuill. à thé de bicarbonate de soude (petite vache) dans 4 tasses (1 litre) d'eau. Cette solution se conserve 48 heures au réfrigérateur. Ne pas boire ni manger 15 à 30 minutes après avoir fait le gargarisme.*

- Évitez les gargarismes à base d'alcool.
- Si votre bouche devient sensible ou que vous avez de la difficulté à boire ou manger, contactez votre équipe soignante.

Vigilance

Le ribociclib peut prédisposer certaines personnes à présenter des **arythmies cardiaques** (trouble du rythme cardiaque). C'est pourquoi un électrocardiogramme (ECG) vous sera fait avant de débiter le traitement puis environ 2 semaines après avoir débuté la médication. **Si toutefois vous présentez des symptômes tels : une douleur à la poitrine, des palpitations, des étourdissements ou une sensation de tête légère ou un évanouissement, consultez un médecin sans tarder.**

La [neutropénie](#) (baisse des globules blancs) est l'effet secondaire le plus fréquent avec le ribociclib. C'est pourquoi vous devrez avoir des prises de sang régulièrement. **IL EST TRÈS IMPORTANT QUE VOUS RESPECTIEZ L'HORAIRE DES PRISES DE SANG PRÉVUES.** Aucun aliment ne peut aider à prévenir la neutropénie.

Une **thrombocytopénie** (baisse des plaquettes sanguines) est possible. C'est pourquoi **VOUS DEVEZ VOUS CONFORMER AUX PRISES DE SANG PRÉVUES.** Un faible nombre de plaquettes sanguines peut prédisposer aux saignements. L'alimentation a généralement peu d'effets sur les plaquettes. Ne prenez pas d'ibuprofène (Advil^{md}, Motrin^{md}) sans en parler à votre équipe soignante. Consultez à l'urgence si vous présentez un saignement qui n'arrête pas, du sang dans vos selles ou votre urine.

Si vous notez **une nouvelle sensibilité ou de l'enflure inhabituelle au mollet**, appelez votre équipe soignante ou si vous éprouvez une **douleur à la poitrine** ou de la **difficulté soudaine à respirer**, avisez immédiatement un membre de l'équipe soignante ou présentez-vous à l'urgence.

Vérifiez toujours la conduite avec votre médecin avant de subir une chirurgie ou une intervention dentaire invasive.

Quant aux vaccins, le Centre des maladies du sein (CMS) vous réfère aux directives de la santé publique en matière de vaccination.

N. B. Consultez notre site Internet maladiesdusein.ca pour obtenir des réponses à vos questions et trouver plus d'informations sur les inhibiteurs de CDK 4 / 6 ([GUIDE 6](#)), la gestion des effets secondaires, le cancer et ses conséquences, les stratégies aidantes et les ressources.